

ANAMED[®] Guia para a Cultura das Frutas



ISCA

Nosso produto, ANAMED WB

ANAMED WB é um atrativo alimentar que, utilizado com inseticida, funciona como um atrain-e-mata.

O produto é utilizado para reduzir as populações e os danos causados pela mosca-das-frutas *Ceratitis capitata* na cultura das frutas.

Recomendação: Aplicações de ANAMED WB, com intervalos quinzenais, durante o período de frutificação.




Detalhe com as moscas mortas após ingerirem o produto

Como aplicar

O início de aplicação deve coincidir com o início do período de ataque ou baseado em monitoramento, quando houver.

Aplique um litro de ANAMED WB diluído em um litro de água.

A proporção máxima é de 1:1 (um pra um), com adição de inseticida previamente selecionado.



Preparação da calda

1_ misture previamente o inseticida na água, obtendo uma mistura homogênea.

1


—



2_ Acrescente o ANAMED WB, na proporção de 1:1..

2

—



3

—



A aplicação do ANAMED

A aplicação do atrai-e-mata é feita com um pulverizador costal ou equipamento que produza o jato desejado.

Retire os filtros, assim como o difusor do bico, para que seja formado um jato contínuo na aplicação.

Faça um jato de gotas grossas obtendo um ponto espesso de maior residual.



© ISCA IMAGENS/Rafael Borges





Distribuição:


Utilize de 2 a 4 litros da calda de ANAMED WB (mistura de ANAMED WB + ÁGUA + INSETICIDA) por hectare, aplique os pontos em plantas e filas alternada.

Aplicar a uma altura de aproximadamente 1,8m de altura. Pode ser utilizado equipamento costal ou tratorizado. Padronizar a pulverização em gotas grossas, distribuindo uniformemente o volume de calda na área.



© ISCA IMAGENS/Samuel Betkowski

Captura de Ceratis capitata





**Next
Generation
Insect
Control**

ISCA Brasil
BR 285, km 461,1 nº 2951
Ijuí-RS, 98700-000, Brasil
Tel.: +55 (55) 3332-2326
www.isca.com.br

Obrigado!

Gustavo S. Nunes
gnunes@isca.com

Rodrigo Ferreira
rferreira@isca.com